



**TANGGAARD**  
DANSK VANDINGSTEKNIK

Nyhed til Danske Gartnere


Oktober 2019

Vi er glade for at kunne præsentere Jer for et nyt banebrydende grønt skadedyrsmiddel - Siltac SF. Midlet har stor udbredelse i bl.a. Holland, hvor det har vist sig at have en rigtig god virkning over for lus, hvide fluer, spinde-mider, trips og pærebladlopper.

Allerede nu kan det i væksthuse/planteskolekulturer være et rigtig godt alternativ til de traditionelle insekticider. En stor fordel ved dette middel er, at skadedyrene ikke opbygger resistens, da virkemåden er baseret på en fysisk mekanisme.

**Virkemåde:**

Siltac SF består af en unik kombination af silikone polymere forbindelser, der danner en tredimensionel polymer gitterstruktur - en slags "net/film" over skadedyrene, så de ikke kan bevæge sig. De ramte skadedyr immobiliseres og dør inden for ca. 90 sekunder. Midlet skal derfor i kontakt med skadedyret, for at der sker en virkning. Æg kan ikke bekæmpes. Midlet har ingen behandlingsfrist. Fugtigheden på planterne bevirker, at midlet går i opløsning og forsvinder.




På billedet ses, hvordan Siltac SF danner gitterstruktur, der immobiliserer skadedyret.

På linket: [https://youtu.be/d1nvb\\_AOohQ](https://youtu.be/d1nvb_AOohQ) vises en lille video på engelsk, der bl.a. beskriver midlets virkning og fordele.

**TANGGAARD A/S**

Pilebækvej 7 • DK - 4632 Bjæverskov • tel: +45 5687 0274  
info@tanggard.dk • www.tanggard.dk • SE nr. 28135432

Der findes flere hollandske forsøg, der dokumenterer en rigtig god virkning af Siltac SF. Nedenfor ses forsøg i æbler, sort Jonagold, hvor Siltac SF er sammenlignet med insekticider til bekæmpelse af spindemider. Behandling er foretaget 3/7-18 med doseringen 0,15%. Det fremgår, at Siltac SF er meget effektiv over for spindemiderne.



Siltac SF anbefales til brug i frugt, grøntsager, pryddplanter og kornafgrøder.

#### Anvendelse væksthus:

- Start behandlingen ved konstatering af lus, hvide fluer, spindemider eller trips.
- Skal ud sprøjtes på tørre planter ved en luftfugtighed på højst 65 % rh.
- Tomat, agurk, peberfrugt – Dosering: 0,05-0,07 % (50-70 ml/100 l vand). Der sprøjtes efter behov med minimum 7 dages interval.
- Andre væksthuskulturer - Dosering: 0,1% (100 ml/100 l vand). Der sprøjtes efter behov med minimum 7 dages interval.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Med venlig hilsen  
Charlotte Ibsen

Tanggaard A/S er forhandler af Siltac SF i Danmark  
Pakning: Siltac SF: 1 L – 5 L

#### TANGGAARD A/S

Pilebækvej 7 • DK - 4632 Bjæverskov • tel: +45 5687 0274  
info@tanggard.dk • www.tanggard.dk • SE nr. 28135432