



**TANGGAARD**  
DANSK VANDINGSTEKNIK

Til agurk- og tomatproducenter

februar 2020

Så er det ca. et år siden, at vi præsenterede Jer for det nye grønne skadedyrsmiddel - Siltac SF, hvor virkemåden er baseret på en fysisk mekanisme, og de ramte skadedyr immobiliseres og dør inden for ca. 90 sekunder.

#### **Jeres erfaringer:**

I det forgangne år har vi takket være Jer fået mange danske erfaringer om midlet.

Og kan fastslå, at midlet er særdeles effektivt over for hvide fluer, spindemider og lus, men har også en god virkning over for trips.

Problematikken er dog her at ramme tripsene, da midlet jo skal i kontakt med skadedyret, for at der opnås en virkning. Ved behandling for trips anbefaler vi derfor fremadrettet, at doseringen sættes lidt ned, men væskemængden øges, så der sker en bedre dækning.



#### **Optimal sprøjtning med Siltac SF:**

Vi minder om, at det er vigtigt at sprøjte midt på dagen, hvor temperaturen er høj og den relative luftfugtighed (rh) er lav. Der skal altid sprøjtes på tør afgrøde og midlet skal kunne tørre inden for få timer. Hvis den relative luftfugtighed er mere end 65 %, kan vokslaget på bladene blive beskadiget og dette kan give svidninger på følsomme afgrøder (f.eks agurker og tomater) specielt i vinterhalvåret, hvor vokslaget på bladene er tyndere. Det er kun, når Siltac SF ikke bruges korrekt og derfor ikke hærdner og tørre op inden for få timer efter sprøjtning, der kan være risiko for svidninger. Når fugtigheden stiger hen under aften, går molekylet i opløsning og bliver til frie ioner.

**TANGGAARD A/S**

Pilebækvej 7 • DK - 4632 Bjæverskov • tel: +45 5687 0274  
info@tanggard.dk • www.tanggard.dk • SE nr. 28135432

### **Brugsanvisning:**

- Start behandlingen ved konstatering af lus, hvide fluer, spinde- mider eller trips
- Skal udsprøjtes på tørre planter ved en luftfugtighed på højst 65 % rh.
- Tomat, agurk, peberfrugt – Dosering: 0,05-0,07 % svarer til 50-70 ml/100 l vand (ved behandling for trips: 0,05 %, 50 ml/100 l vand).  
Der sprøjtes efter behov med minimum 7 dages interval.
- Andre væksthuskulturer - Dosering: 0,1 % svarer til 100 ml/100 l vand (ved behandling for trips: 0,08 %, 80 ml/100 l vand).  
Der sprøjtes efter behov med minimum 7 dages interval.

**Det er en stor fordel ved Siltac SF, at der ikke er nogen be-  
handlingsfrist og der ikke efterlades reststoffer.**

På linket: [https://youtu.be/d1nvv\\_AOohQ](https://youtu.be/d1nvv_AOohQ) vises en lille video på engelsk, der bl.a. beskriver midlets virkning og fordele.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Med venlig hilsen

Charlotte Ibsen

Tanggaard A/S er forhandler af Siltac SF i Danmark  
Pakning: Siltac SF: 1 L – 5 L

**TANGGAARD A/S**

Pilebækvej 7 • DK - 4632 Bjæverskov • tel: +45 5687 0274  
info@tanggard.dk • www.tanggard.dk • SE nr. 28135432